

報道関係者各位

2019年6月5日

沢井製薬株式会社

リネゾリド注射液 600mg「サワイ」／リネゾリド錠 600mg「サワイ」

- 効能・効果追加承認取得のお知らせ -

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、本日6月5日、リネゾリド注射液 600mg「サワイ」／リネゾリド錠 600mg「サワイ」につきまして、「効能・効果」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

これにより、先発品との適応不一致が解消され、先発品と同様に使用していただけるようになりました。

| | |
|------------------------------|---|
| <p>効能・効果 (下線部分が追加項目)</p> | <p>1. <適応菌種> <u>本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)</u> <適応症> <u>敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎</u></p> <p>2. <適応菌種> 本剤に感性のバンコマイシン耐性エンテロコッカス・フェシウム <適応症> 各種感染症</p> |
| <p>用法・用量</p> | <p>○リネゾリド錠 600mg「サワイ」 通常、成人及び12歳以上の小児にはリネゾリドとして1日1200mgを2回に分け、1回600mgを12時間ごとに経口投与する。 通常、12歳未満の小児にはリネゾリドとして1回10 mg/kgを8時間ごとに経口投与する。なお、1回投与量として600mgを超えないこと。</p> <p>○リネゾリド注射液 600mg「サワイ」 通常、成人及び12歳以上の小児にはリネゾリドとして1日1200 mgを2回に分け、1回600mgを12時間ごとに、それぞれ30分～2時間かけて点滴静注する。 通常、12歳未満の小児にはリネゾリドとして1回10mg/kgを8時間ごとに、それぞれ30分～2時間かけて点滴静注する。なお、1回投与量として600mgを超えないこと。</p> |

◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 戦略企画部 広報・IRグループ

TEL：06-6105-5718／E-mail：koho@sawai.co.jp