

報道関係者各位

2019 年 8 月 28 日

沢井製薬株式会社

カンデサルタン錠 2mg／4mg／8mg／12mg 「サワイ」
カンデサルタン OD 錠 2mg／4mg／8mg／12mg 「サワイ」
－ 用法・用量追加承認取得のお知らせ －

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、本日 8 月 28 日、カンデサルタン錠 2mg／4mg／8mg／12mg「サワイ」および、カンデサルタン OD 錠 2mg／4mg／8mg／12mg「サワイ」につきまして、「用法・用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

これにより、先発品と同様に使用していただけるようになりました。

効能・効果	[錠 2mg／4mg／8mg／12mg ・ OD 錠 2mg／4mg／8mg／12mg] 高血圧症 腎実質性高血圧症 [錠 2mg／4mg／8mg ・ OD 錠 2mg／4mg／8mg] 下記の状態、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 慢性心不全（軽症～中等症）
用法・用量 (下線部分が追加項目)	[錠 2mg／4mg／8mg／12mg ・ OD 錠 2mg／4mg／8mg／12mg] 高血圧症 成人 通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 4～8 mg を経口投与し、必要に応じ 12 mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1 日 1 回 2 mg から投与を開始し、必要に応じ 8 mg まで増量する。 小児 <u>通常、1 歳以上 6 歳未満の小児には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 0.05～0.3 mg/kg を経口投与する。</u> <u>通常、6 歳以上の小児には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 2～8 mg を経口投与し、必要に応じ 12 mg まで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、低用量から投与を開始し、必要に応じて 8 mg まで増量する。</u> 腎実質性高血圧症 通常、成人には 1 日 1 回カンデサルタン シレキセチルとして 2 mg から経口投与を開始し、必要に応じ 8 mg まで増量する。

	[錠 2mg／4mg／8mg・OD 錠 2mg／4mg／8mg] 下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 慢性心不全（軽症～中等症） 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4 mgから経口投与を開始し、必要に応じ8 mgまで増量できる。なお、原則として、アンジオテンシン変換酵素阻害剤以外による基礎治療は継続すること。
--	--

◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 戦略企画部 広報・IR グループ

TEL：06-6105-5718／E-mail：koho@sawai.co.jp