

報道関係者各位

2019年10月30日

沢井製薬株式会社

ピタバスタチン Ca 錠 1mg/2mg 「サワイ」
 ピタバスタチン Ca・OD 錠 1mg/2mg 「サワイ」
 - 用法・用量追加承認取得のお知らせ -

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、本日10月30日、ピタバスタチン Ca 錠 1mg/2mg 「サワイ」 およびピタバスタチン Ca・OD 錠 1mg/2mg 「サワイ」につきまして、「用法・用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。
 これにより、先発品と同様に使用していただけるようになりました。

<p>効能・効果</p>	<p>高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症</p>
<p>用法・用量 (下線部分が追加項目)</p>	<p><u>高コレステロール血症</u> 通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p> <p><u>家族性高コレステロール血症</u> 成人：通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1~2mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。</p> <p><u>小児：通常、10歳以上の小児にはピタバスタチンカルシウムとして1mgを1日1回経口投与する。</u> なお、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日2mgまでとする。</p>

◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 戦略企画部 広報・IRグループ

TEL：06-6105-5718/E-mail：koho@sawai.co.jp