

報道関係者各位

2018年9月5日

沢井製薬株式会社

アリピプラゾール錠 3 mg / 6mg / 12mg / 24mg 「サワイ」
アリピプラゾール内用液 3mg 分包 / 6mg 分包 / 12mg 分包 「サワイ」
 - 効能・効果および用法・用量追加承認取得のお知らせ -

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、本日9月5日、アリピプラゾール錠 3 mg / 6mg / 12mg / 24mg 「サワイ」・アリピプラゾール内用液 3mg 分包 / 6mg 分包 / 12mg 分包 「サワイ」につきまして、「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

効能・効果 (下線部分が追加項目)	・統合失調症 ・<u>双極性障害における躁症状の改善</u>
用法・用量 (下線部分が追加項目)	○アリピプラゾール錠 3 mg / 6mg / 12mg / 24mg 「サワイ」 ・統合失調症 通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。 ・<u>双極性障害における躁症状の改善</u> <u>通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。</u> ○アリピプラゾール内用液 3mg 分包 / 6mg 分包 / 12mg 分包 「サワイ」 ・統合失調症 通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。 ・<u>双極性障害における躁症状の改善</u> <u>通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。</u>

◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 戦略企画部 広報・IRグループ

TEL：06-6105-5718／E-mail：koho@sawai.co.jp