

報道関係者各位

2018年6月14日 沢井製薬株式会社

ジェネリック医薬品7成分17品目の新製品を発売

沢井製薬株式会社(本社:大阪市淀川区、代表取締役社長:澤井光郎)は、本日6月14日に、ジェネリック医薬品7成分17品目について薬価基準への収載が官報告示されたことをお知らせいたします。薬価基準の適用日である明日6月15日以降、順次発売いたします。新製品の発売により、沢井製薬が取り扱う製品ラインアップは302成分738品目となります。

※イルアミクス[®]配合錠 LD/HD「サワイ」の有効成分は「イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩」(配合剤)で、1成分としてカウントしています。

◆新製品ハイライト

ミノドロン酸錠 50mg は、適正使用・利便性を考慮したパッケージ付き PTP シートを採用しております。

業界で初めての特殊な技術を用い、折り曲げて錠剤を取り出せる デザイン仕様にしました。患者さんに、より扱いやすい包装の工夫を 行った製剤です。また、4週に1回1錠を服用する薬のため、 服用のタイミングを大きく表示しています。





ミノドロン酸錠 50 mg「サワイ」取り出し方解説動画はこちらからご覧いただけます。

ナルフラフィン OD 錠*は血液透析治療をうけられている患者さんの、 そう痒症の改善に使用されます。一回の透析で除くことのできる水分量には 限りがあります。透析患者さんは摂取する水分量を制限されていることがあり、 そのため、水なしでも服用することが可能な OD 錠*にすることで患者さんの 服用負担の軽減を目指しました。

ナルフラフィン OD2.5 μg 塩酸塩 OD2.5 μg ナルフラフィン ナルフラフィン SW NF2.5 NF2.5 OD 2.5 μg OD 2.5 μg OD 2.5 μg

※0D 錠···口腔内崩壊錠

オセルタミビルカプセル・ドライシロップのジェネリック医薬品は 当社のみの発売となります。先発品のタミフルは、国の備蓄医薬品に 指定されており、インフルエンザ・パンデミックに備える重要な役割を担っています。 そのようなニーズのある製剤のジェネリック医薬品を、発売することができました。 日本医療の発展のために、これからも沢井製薬はお役に立ち続けます。







◆6月15日に薬価基準が適用される新製品(ジェネリック医薬品)

薬効分類名	製品名	先発品名
長時間作用型 ARB/ 持続性 Ca 拮抗薬配合剤	イルアミクス [®] 配合錠 LD「サワイ」 イルアミクス [®] 配合錠 HD「サワイ」	アイミクス [®] 配合錠 LD アイミクス [®] 配合錠 HD
選択的ヒスタミンH ₁ 受容体拮抗・ アレルギー性疾患治療剤	ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 5mg「サワイ」**1 ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「サワイ」**1 ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg「サワイ」**1 ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg「サワイ」**1	タリオン*OD 錠 5mg タリオン*OD 錠 10mg タリオン*錠 5mg タリオン*錠 10mg
骨粗鬆症治療剤	ミノドロン酸錠 1mg「サワイ」 ミノドロン酸錠 50mg「サワイ」	ボノテオ*錠 1 mg ボノテオ*錠 50 mg リカルボン*錠 1 mg リカルボン*錠 50 mg
抗てんかん剤、 双極性障害治療薬	ラモトリギン錠 25 mg「サワイ」 ^{※2} ラモトリギン錠 100 mg「サワイ」 ^{※2}	ラミクタール*錠 25 mg ラミクタール*錠 100 mg
抗てんかん剤	ラモトリギン錠小児用 2 mg「サワイ」**2 ラモトリギン錠小児用 5 mg「サワイ」**2	ラミクタール [®] 錠小児用 2 mg ラミクタール [®] 錠小児用 5 mg
経口そう痒症改善剤	ナルフラフィン塩酸塩 OD 錠 2.5μg「サワイ」 ^{※3}	レミッチ°OD 錠 2.5μg レミッチ°カプセル 2.5μg ノピコール°カプセル 2.5μg
高リン血症治療剤	炭酸ランタン顆粒分包 250mg「サワイ」 炭酸ランタン顆粒分包 500mg「サワイ」	ホスレノール [®] 顆粒分包 250mg ホスレノール [®] 顆粒分包 500mg
抗インフルエンザウイルス剤	オセルタミビルカプセル 75 mg「サワイ」 オセルタミビル DS3%「サワイ」	タミフル [®] カプセル 75 タミフル [®] ドライシロップ 3%

^{※1「}小児(7歳以上)のアレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚瘙痒症)に伴う瘙痒」の効能は取得しておりません。

◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 戦略企画部 広報・IR グループ TEL:06-6105-5718/E-mail:koho@sawai.co.jp

^{※2「}てんかん患者の定型欠神発作に対する単剤療法」の効能は取得しておりません。

^{※3「}腹膜透析患者、慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)」の効能は取得しておりません。