

報道関係者各位

2020年8月26日
沢井製薬株式会社

リスペリドン錠 1mg/2mg 「サワイ」
リスペリドン OD 錠 0.5mg/1mg/2mg 「サワイ」
リスペリドン細粒 1% 「サワイ」

- 効能・効果および用法・用量追加承認取得のお知らせ -

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井健造）は、本日8月26日、リスペリドン錠 1mg/2mg 「サワイ」、リスペリドン OD 錠 0.5mg/1mg/2mg 「サワイ」、リスペリドン細粒 1% 「サワイ」につきまして、「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

これにより、先発品と効能・効果および用法・用量が同一になりました。

<p>効能・効果 (下線部分が追加項目)</p>	<p><錠1mg、錠2mg、OD錠0.5mg、OD錠1mg、OD錠2mg、細粒1%> 統合失調症 小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性</p> <p><錠3mg、OD錠3mg> 統合失調症</p>
<p>用法・用量 (下線部分が追加項目)</p>	<p>1) 統合失調症 通常、成人にはリスペリドンとして1回1mg 1日2回より開始し、徐々に増量する。維持量は通常1日2～6mgを原則として1日2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。但し、1日量は12mgを超えないこと。</p> <p>2) 小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性</p> <p>体重15kg以上20kg未満の患者： 通常、リスペリドンとして1日1回0.25mgより開始し、4日目より1日0.5mgを1日2回に分けて経口投与する。症状により適宜増減するが、増量する場合は1週間以上の間隔をあけて1日量として0.25mgずつ増量する。但し、1日量は1mgを超えないこと。</p> <p>体重20kg以上の患者： 通常、リスペリドンとして1日1回0.5mgより開始し、4日目より1日1mgを1日2回に分けて経口投与する。症状により適宜増減するが、増量する場合は1週間以上の間隔をあけて1日量として0.5mgずつ増量する。但し、1日量は、体重20kg以上45kg未満の場合は2.5mg、45kg以上の場合には3mgを超えないこと。</p>

◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 広報・IR 室

TEL：06-6105-5718/E-mail：koho@sawai.co.jp