

報道関係者各位

2021年10月27日  
沢井製薬株式会社

**イマチニブ錠 100mg/200mg 「サワイ」**  
**- 効能・効果および用法・用量追加承認取得のお知らせ -**

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井健造）は、本日10月27日、イマチニブ錠 100mg/200mg 「サワイ」につきまして、「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

<b>効能・効果</b> （下線部分が追加項目）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○慢性骨髄性白血病</li> <li>○<u>KIT (CD117) 陽性消化管間質腫瘍</u></li> <li>○フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病</li> </ul>
<b>用法・用量</b> （下線部分が追加項目）	<p>〈慢性骨髄性白血病〉</p> <p>慢性期：通常、成人にはイマチニブとして1日1回400mgを食後に経口投与する。なお、血液所見、年齢・症状により適宜増減するが、1日1回600mgまで増量できる。</p> <p>移行期又は急性期：通常、成人にはイマチニブとして1日1回600mgを食後に経口投与する。なお、血液所見、年齢・症状により適宜増減するが、1日800mg（400mgを1日2回）まで増量できる。</p> <p><u>〈KIT (CD117) 陽性消化管間質腫瘍〉</u></p> <p><u>通常、成人にはイマチニブとして1日1回400mgを食後に経口投与する。なお、年齢・症状により適宜減量する。</u></p> <p>〈フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病〉</p> <p>通常、成人にはイマチニブとして1日1回600mgを食後に経口投与する。なお、血液所見、年齢・症状により適宜減量する。</p>

◆報道関係者様 お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 広報室

TEL : 06-6105-5718 / E-mail : [koho@sawai.co.jp](mailto:koho@sawai.co.jp)