

報道関係者各位

2019年3月6日

沢井製薬株式会社

アリピプラゾール錠 3mg / 6mg / 12mg 「サワイ」
アリピプラゾール内用液 3mg 分包 / 6mg 分包 / 12mg 分包「サワイ」
－ 効能・効果および用法・用量追加承認取得のお知らせ －

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、本日3月6日、アリピプラゾール錠 3mg / 6mg / 12mg 「サワイ」・アリピプラゾール内用液 3mg 分包 / 6mg 分包 / 12mg 分包「サワイ」につきまして、「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

効能・効果 (下線部分が追加項目)	・統合失調症 ・双極性障害における躁症状の改善 ・うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限り）
用法・用量 (下線部分が追加項目)	・統合失調症 通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。 ・双極性障害における躁症状の改善 通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。 ・うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限り） <u>通常、成人にはアリピプラゾールとして3mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として3mgとし、1日量は15mgを超えないこと。</u>

◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 戦略企画部 広報・IRグループ

TEL：06-6105-5718／E-mail：koho@sawai.co.jp