

報道関係者各位

2019 年 3 月 27 日

沢井製薬株式会社

ドネペジル塩酸塩錠 3mg / 5mg / 10mg 「サワイ」
ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg / 5mg / 10mg 「サワイ」
ドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」

- 効能・効果および用法・用量追加承認取得のお知らせ -

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、本日 3 月 27 日、ドネペジル塩酸塩錠 3mg / 5mg / 10mg 「サワイ」、ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg / 5mg / 10mg 「サワイ」およびドネペジル塩酸塩細粒 0.5% 「サワイ」につきまして、「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。これにより、先発品との適応不一致が解消されます。

効能・効果 (下線部分が追加項目)	アルツハイマー型認知症及びレビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制
用法・用量 (下線部分が追加項目)	<u>アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制</u> 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として 1 日 1 回 3mg から開始し、1～2 週間後に 5mg に増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mg で 4 週間以上経過後、10mg に増量する。なお、症状により適宜減量する。 <u>レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制</u> 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として 1 日 1 回 3mg から開始し、1～2 週間後に 5mg に増量し、経口投与する。5mg で 4 週間以上経過後、10mg に増量する。なお、症状により 5mg まで減量できる。

◆お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 戦略企画部 広報・IR グループ

TEL：06-6105-5718／E-mail：koho@sawai.co.jp