

ペメトレキセド点滴静注液100mg／500mg／800mg「サワイ」・
ペメトレキセド点滴静注用100mg／500mg／800mg「サワイ」
－「用法及び用量」追加承認取得のお知らせ－

沢井製薬株式会社(本社:大阪市淀川区、代表取締役社長:木村元彦)は、1月22日、ペメトレキセド点滴静注液100mg／500mg／800mg「サワイ」及びペメトレキセド点滴静注用100mg／500mg／800mg「サワイ」につきまして、「用法及び用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。

これにより、先発品と同様に使用していただけるようになりました。

効能又は効果

- 悪性胸膜中皮腫
- 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
- 扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法

用法及び用量(下線部分が変更内容)

〈悪性胸膜中皮腫〉

シスプラチンとの併用において、通常、成人にはペメトレキセドとして、1日1回500mg/m²(体表面積)を10分間かけて点滴静注し、少なくとも20日間休薬する。これを1コースとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

〈切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌〉

通常、成人にはペメトレキセドとして、1日1回500mg/m²(体表面積)を10分間かけて点滴静注し、少なくとも20日間休薬する。これを1コースとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

〈扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における術前補助療法〉

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはペメトレキセドとして、1日1回500mg/m²(体表面積)を10分間かけて点滴静注し、少なくとも20日間休薬する。これを1コースとし、最大4コース投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

◆報道関係者様お問い合わせ先◆

沢井製薬株式会社 コーポレートコミュニケーション部

TEL:06-6105-5718／E-mail: koho@sawai.co.jp